

山羊抗兔IgG HRP说明书

Goat Anti-Rabbit IgG, Peroxidase Conjugated, H+L



规格：原装进口为2.0ml 进口分装为0.1ml（另加0.1ml甘油）

浓度：0.8mg/ml

稀释范围：1:500 - 1:5,000 for immunohisto/cytochemistry

1:5,000 - 1:100,000 for ELISA and Western blotting with chromogenic substrates

1:10,000 - 1:200,000 for Western blotting with ECL substrates

缓冲液：0.01M的磷酸钠、0.25M的NaCl、pH7.6

稳定剂：15mg/ml牛血清白蛋白（不含IgG和蛋白酶）

防腐剂：无。警告：叠氮钠是辣根过氧化物酶的抑制剂，不能作为防腐剂

分装及储存：

- 1、在进口原装抗体分装时，加入50%灭菌的甘油，能延长试剂的保存期。但应注意的
是，此时抗体的浓度及稀释比例应降低一倍。
- 2、初次使用参考推荐的稀释比例，实际实验操作过程中需根据抗原和抗体的具体情况
适当调节二抗的稀释比例。但应注意，需用现配，因为稀释后抗体的有效活性会很快降低。
- 3、-20℃保存，避免反复冻融。

保存条件：-20℃保存一年